



# BOLETIN INFORMATIVO PAI

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION – SEDES CBBA

Volumen 6, No. 5 mayo 2006 - Cochabamba - Bolivia

## LOGROS DE LA PRIMERA SEMANA DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA RUBEOLA Y LA RUBEOLA CONGÉNITA EN COCHABAMBA

Cochabamba, inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita el 02 de mayo 2006, con la meta de vacunar a hombres y mujeres de 15 a 39 años de edad, totalizando 685.407 personas.

Esta campaña durará cuatro semanas; las dos primeras, destinadas a vacunar en los lugares de trabajo, colegios, universidades, mercados, cuarteles y otros lugares donde exista concentración de personas. Las dos últimas semanas, se vacunará casa por casa. Para ello, se tienen 1000 brigadas (vacunador y registrador) trabajando en todo el departamento.

### RESULTADOS DE LA PRIMERA SEMANA DE VACUNACIÓN.

El sistema de información está organizado para la captación y procesamiento de datos de la campaña de vacunación, habiendo reportado la primera semana, lo siguiente:

- Se ha logrado un 34,8 % de cobertura a nivel departamental
- En el Cercado se llegó al 43,1% (este, es el municipio que concentra la mayor cantidad de población). Los pormenores, se detallan en la siguiente tabla:


### PRIMERA SEMANA, VACUNACION CONTRA LA RUBEOLA EN COCHABAMBA, MAYO 2006

Nº	RED	META	VACUNADOS	% COBERTURA
1	CERCADO	263.316	113.372	43,1
2	PUNATA	31.093	16.285	52,4
3	VILLA TUNARI	31.526	9.580	30,4
4	IVIRGARZAMA	40.047	8.054	20,1
5	QUILLACOLLO	144.835	39.900	27,5
6	SACABA	68.575	21.037	30,7
7	CAPINOTA	20.063	5.260	26,2
8	TOTORA	17.069	3.505	20,5
9	AIQUILE	13.374	3.973	29,7
10	MIZQUE	13.433	3.738	27,8
11	INDEPENDENCIA	8.768	2.519	28,7
12	TAPACARI	9.831	2.955	30,1
13	TARATA	23.477	8.292	35,3
<b>Total</b>		<b>685.407</b>	<b>238.470</b>	<b>34,8</b>

Fuente: SNIS- PAI-Cbba

Los datos de la anterior tabla, muestran en la siguiente gráfica los logros de la primera semana, por Redes de Salud y en porcentajes del mayor a menor rendimiento.

## Datos oficiales de la primera semana de vacunación contra la rubéola. Cochabamba, Mayo 2006



Fuente: SNIS- PAI CBBA

### SITUACIÓN DEL MUNICIPIO CERCADO.

La ciudad de Cochabamba, en la estructura de salud vigente, tiene la denominación de Gerencia del Cercado, la cual, pese a los logros interesantes de la primera semana, por su complejidad, por abarcar la mayor cantidad de población cautiva y tener un flujo comercial y laboral importante, necesita reforzar algunos aspectos, entre estos, está: mejorar la demanda de vacunación en la UMSS, porque allí, se concentran cerca de 50.000 estudiantes del grupo objetivo de la campaña.

Por ello, reiteramos la convocatoria a las autoridades universitarias para que se sumen a este esfuerzo nacional, que más allá de la salud individual, vela por la salud pública y colectiva de nuestra población.

### TENER PRESENTE:

“UNA SOLA VEZ ES PARA SIEMPRE”

“CUIDA Y PORTA TU CARNET DE VACUNACIÓN”

**VISITE LA PAGINA WEB <http://www.ops.org.bo/rubeola/>**

---

EDICIÓN: SEDES, EPIDEMIOLOGÍA- PAI - CBBA Teléfonos: 4220966 - 4220967

---

## RECOMENDACIONES OPERATIVAS PARA EL CORRECTO CARGADO DE LA JERINGA CON VACUNA SR

1. Contar con el equipo adecuado y completo.
  2. Cargar **5 ml** del diluyente frío para obtener 10 dosis completas, si no se cargan los 5 ml, se obtienen menos dosis y sube a más del 15 % el factor pérdida.
  3. Reconstituido el biológico, no introducir la aguja más allá del líquido para no cargar aire (esto, dificulta obtener la dosis correcta de 0,5 ml) y al sacar el aire, se bloquea la jeringa, ocasionando la pérdida de la vacuna y de la jeringa.
  4. En algunos casos, por esta dificultad, el personal aplica dosis incompleta.
  5. Consultar frecuentemente el “manual de capacitación de brigadas de la campaña de la Eliminación de la Rubéola”.
-